



版本号:130318

## TRIpure Reagent TRIpure Reagent 总 RNA 提取试剂

目录号: RN01

### ❖ 试剂盒组成、储存、稳定性:

试剂盒组成	(RN0101)	(RN0102)
TRIpure (4℃避光)	50 ml	100 ml

### ❖ 储存事项:

TRIpure 在室温下能稳定保存 12 个月。尽管如此, 为达到最佳效果, 我们建议保存在 2~8℃ 的环境下。

### ❖ 重要提示:

本品中含有苯酚, 具有毒性和腐蚀性。如果吸入体内、接触皮肤、吞食等会导致中毒、灼伤以及其他身体伤害。使用本制品时应穿戴防护物品, 如防护服装、手套、眼罩、面罩等。如果不小心接触, 应立即用大量的水冲洗并前往医院治疗。

### ❖ 产品介绍:

TRIpure 是广谱型总 RNA 提取试剂。实验操作快速方便, 颜色鲜明, 便于分层。本试剂适用范围广泛, 可以从动物组织、植物材料、各种微生物及培养细胞等样品中提取总 RNA。该方法对少量的组织(50-100mg)和细胞( $5 \times 10^6$ )以及大量的组织( $\geq 1g$ )和细胞( $> 10^7$ )均有较好的分离效果。样品在 TRIpure 中被充分裂解的同时能够最大限度地保证 RNA 的完整性。在加入氯仿离心后, 溶液会分成三层: 上层无色水相、中间层和下层红色有机相, RNA 分布在上清层中。收集上清层后, 经异丙醇沉淀便可以回收得到总 RNA。提取的总 RNA 完整性好, 无蛋白和 DNA 污染, 可用于各种分子生物学常规实验, 如 RT-PCR、Real-time RT-PCR、Northern blot、Dot Blot、体外翻译等。

TRIpure 试剂能促进不同种属不同分子量大小的多种 RNA 的析出。例如, 从大鼠肝脏抽提的 RNA 琼脂糖凝胶电泳并用溴化乙啶染色, 可见许多介于 7kb 和

15 kb 之间不连续的高分子量条带(mRNA 和 hnRNA 成分), 两条优势核糖体~5 kb(28S)和~2 kb(18S), 低分子量 RNA 介于 0.1 和 0.3 kb 之间 (tRNA, 5S)。当抽提的 RNA 用 TE 稀释时其 A260/A280 比值 $\geq 1.8$ 。**注意如果是普通琼脂糖凝胶电泳, 28S 的位置大约在 2kb, 18S 大约在 1kb 的位置, 不同浓度的凝胶位置变化较大。**

❖ **注意事项:**

1. 样品用 TRIpure 匀浆后, 如果不即刻加入氯仿之前, 置于-70°C 下可放置一个月以上。保存在 75%乙醇中的 RNA 沉淀, 2-8°C 可以保存一周, -20°C 条件下可以保存 1 年。RNA 半衰期比较短, 容易降解, 建议提取后尽快进行后续实验, 如反转录成 cDNA, Northern Blot 等。
2. 若下游实验对 DNA 非常敏感, 建议用 RNase free DNase I (货号: RN45) 对 RNA 进行处理。
3. 自备试剂: 氯仿、异丙醇 (新开封或提取 RNA 专用)、75%乙醇(用 DEPC 处理过的水配制)、RNase free water 或者 DEPC 处理过的水。
4. 本公司生产 TRIpure Reagent 质量优异, 可以完美替代 Invitrogen 的 Trizol Reagent。提取质量和下游实验完全一样。已经销售 8 年数万瓶。从无质量问题。客户如果购买本公司 TRIpure Reagent 证明不能替换 Invitrogen 的 Trizol, 无条件退货, 并 3 倍销售价格赔偿。

❖ **RNA 抽提操作步骤: (实验前请先阅读注意事项)**

**提示:** 用 TRIpure 抽提 RNA 时要戴手套和护眼镜。避免接触皮肤和衣服。在化学通风橱完成操作。避免呼吸道吸入。如无特殊说明, 所有的操作应该在在 15~30°C 的室温条件下。

1. **匀浆**
  - a. 植物组织: 取新鲜植物组织在液氮中充分研磨或将植物组织剪碎后直接在 TRIpure 中迅速研磨, 每 50-100mg 组织加入 1ml TRIpure, 混匀。注意: 样品体积一般不要超过 TRIpure 体积的 10%。
  - b. 动物组织: 取新鲜或-70°C 冻存动物组织尽量剪碎, 每 30-100mg 组织加入 1ml TRIpure, 匀浆仪进行匀浆处理。或在液氮中研磨后加入 TRIpure 1ml 混匀。注

意：样品体积一般不要超过TRIpure体积的10%。

- c. 单层培养细胞：尽量去除干净残留培养液后直接往直径3.5 cm的培养板中加入 1ml 的TRIpure覆盖并反复吹打裂解细胞。依据培养板的面积而不是依据细胞的数量来决定所需的TRIpure 量（每10cm<sup>2</sup>加1ml）。当TRIpure 量不足时可导致抽提的RNA中污染有DNA。

**注意：贴壁培养细胞往往不能完全从培养瓶（皿）脱落，这并不意味着裂解不完全，此时细胞膜实际已经完全破裂开，并已释放出全部RNA，继续做即可。**

- d. 细胞悬液：离心收集细胞。在TRIpure 试剂中用移液管反复吹打来裂解细胞。每5~10×10<sup>6</sup>的动物细胞，植物或酵母菌细胞或每1×10<sup>7</sup>细菌加1ml的TRIpure。在加入TRIpure 前应避免洗涤细胞，因为那样会增加mRNA降解的可能性。破裂某些酵母菌和细菌可能需要使用匀浆器。

- e. 血液：推荐使用本公司的TRIpure Reagent LS(货号：RN02)，这是全血或者液体样品专用的TRIpure Reagent，LS就是Liquid Sample 液体样品的首字母简写。相当于Invitrogen公司的 TRIzol LS 。

2. 将匀浆样品剧烈震荡后在室温条件下放置 5 分钟以使核蛋白体完全解离。

3. **可选步骤：** 在 4°C 的条件下以 12,000 rpm 的离心力离心 10 分钟，取上清。

**如样品中含有较多蛋白质，脂肪，多糖或肌肉，植物的块茎结节等可离心去除。离心后的沉淀中包含有细胞外膜，多糖，以及高分子量 DNA，上清中含有 RNA。处理脂肪组织的样品时，上层是大量油脂应除去。取澄清的匀浆液进行下一步。**

4. 每 1ml TRIpure 加 0.2ml 氯仿。盖紧管盖，剧烈震荡 15 秒并将其在室温下放置 2~3 分钟。

5. 在 4°C 12,000 rpm 的离心力高速冷冻离心 10-15 分钟。离心后混合物分成三层：下层红色有机苯酚氯仿层，中间层，上层无色的水样层。RNA 无一例外地存在于水样层当中。水样层的容量大约为所加 TRIpure 容量的 50-60%。（有机层和中间层是蛋白和 DNA，如果需要提取，请联系我们索取提取方法）。

6. 将水样层转移到一干净的离心管中，加入等体积异丙醇。颠倒混匀后室温放置 10 分钟。

**RNA 沉淀在离心前通常不可见，离心后在管侧和管底形成胶状沉淀。**

7. 在室温或者 4°C 12,000 rpm 离心 10 分钟，弃上清。
8. 加入 75%乙醇洗涤沉淀。每使用 1 ml TRIpure 用 1 ml 75%乙醇对沉淀进行洗涤。
9. 在室温或者 4°C 12,000 rpm 离心 3 分钟，弃上清，注意不要丢失 RNA 沉淀。

**注意：剩余的少量液体可短暂离心，然后用枪头吸出，注意不要吸弃沉淀。**

10. 室温放置 2-3 分钟，晾干。加入 30-100ul RNase free water，充分溶解 RNA，得到的 RNA 保存在-70°C，防止降解。

**注意：沉淀不要过分干燥，以免难于溶解。**